

Vísceras retroperitoneales (Reconstrucciones anatómicas por planos)

Identificar

1. Aorta abdominal: Relación topográfica con la vena cava inferior, plexo solar, venas renales.
 - a) Ramas Parietales: diafragmáticas inferiores, lumbares y sacra media (en plano más profundo).
 - b) Ramas Viscerales:
 1. tronco celiaco (en plano más superficial se reconoce la gástrica izquierda, la hepática y la esplénica)
 2. mesentérica superior, justo encima de la vena renal izquierda.
 3. arteria suprarrenal media.
 4. arteria renal.
 5. gonadales.
 6. mesentérica inferior.
2. Vena cava inferior recibiendo venas suprarrenales, renales y gonadales (la gonadal izquierda termina en la renal izquierda) y justo debajo del diafragma las suprahepáticas.
3. Ortosimpático:
 - a) Componente de nervios esplácnicos para formar el plexo solar (ganglios celiacos + mesentérico superior)
 - b) Componente de cadena ortosimpática paravertebral a nivel abdominal (plexo hipogástrico).
4. Parasimpático (asa de Wrisberg) dirigiéndose a plexo solar.
5. Cisterna de Pequet delante de la aorta abdominal. Glándulas suprarrenales: diferente forma entre derecha e izquierda. Arterias suprarrenales superiores (de diafragmática), medias (de aorta) e inferior (de renal).
- 6.- Riñón:
 - a) Diferencia en la localización (altura) derecho e izquierdo.
 - b) Grasa perirrenal y celda renal.
 - c) Pedículo renal: de anterior a posterior (vena, arteria y uréter).
 - d) Uréter: relación topográfica con el músculo psoas, vena y arteria gonadal y vena y arteria iliaca.
 - e) Al abrir vemos: cortical, columnas de Bertin y pirámides de Malphigio

Visceras retriperitoneales (Maquetas-Piezas cadavéricas)