

Pregunta 1 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Una de las siguientes entidades NO es causa de hipertensión arterial secundaria ☐ a. Hipotensión intracraneal ☐ b. Síndrome de Cushing ☒ c. Hiperaldosteronismo primario (S. Conn) ☐ d. Coartación aorta ✖
Pregunta 2 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En referencia a los procesos de malabsorción y maldigestión de los nutrientes, señale la respuesta incorrecta: Seleccione una: ☐ a. Algunos ejemplos de enfermedades ocasionadas por la alteración de estos procesos podrían ser la pancreatitis crónica (maldigestión), o la celiakia (malabsorción). ☐ b. En la malabsorción la captación y transporte de nutrientes y electrolitos es defectuoso. ☒ c. A nivel clínico se manifiesta como aumento de peso y estreñimiento ☐ d. En el caso de malabsorción con afectación de la fase mucosa, la superficie luminal o borde en cepillo de los enterocitos, se encuentra dañada. ☐ e. En la maldigestión existen problemas para la transformación de los nutrientes en productos absorbibles más pequeños.
Pregunta 3 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Respecto a la patogenia de la fiebre seleccione lo más apropiado: Seleccione una: ☐ a. Los antígenos bacterianos causan fiebre directamente y los víricos lo hacen a través de las prostaglandinas. ☐ b. Los macrófagos liberan prostaglandinas al contactar con los antígenos, lo que hace que el hipotálamo sintetice el pirógeno endógeno que causa la fiebre ☐ c. El hipotálamo reacciona ante los antígenos bacterianos y secreta prostaglandinas que causan la fiebre. ☒ d. Los antígenos bacterianos hacen que los macrófagos liberen citokinas que activarán la producción de prostaglandinas, que hace que el hipotálamo cause la fiebre.
Pregunta 4 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	¿En que órgano se produce la hormona TSH ? Seleccione una: ☐ a. Tiroides ☐ b. Médula suprarrenal ☐ c. Hipotálamo ☒ d. Adenohipófisis ✔
Pregunta 5 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Que nivel de glucemia postpandrial (post ingesta) se considera adecuado para tener un buen control metabólico: ☒ a. Menor de 180 mg/dl ☐ b. Mayor de 200 mg/dl ☐ c. Entre 190-200 mg/dl ☐ d. No precisa ningún nivel glucémico ✔
Pregunta 6 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	La enfermedad de Parkinson se caracteriza por: Seleccione una: ☐ a. c) La combinación de rigidez piramidal, pérdida de fuerza en las piernas y pérdida de audición. ☐ b. Cuadro progresivo de pérdida de fuerza que comienza en la cara y progresa a parálisis generalizada. ☒ c. Cuadro progresivo de rigidez generalizada, trastorno de la marcha y temblor de reposo. ☐ d. Instauración brusca de temblor generalizado e hiperreflexia. ✔
Pregunta 7 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Una persona con ingestas muy bajas de yodo puede presentar: Seleccione una: ☐ a. Hipertiroidismo ☐ b. Atrofia hipofisaria secundaria ☒ c. Bocio ☐ d. Anticuerpos anti TSH elevados ✔
Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Entre las posibles causas de insuficiencia coronaria, indique cual de las siguientes situaciones no se caracteriza por aumento de las necesidades: ☐ a. Hipertensión arterial ☒ b. Disminución de la contractilidad ☐ c. Hipertrofia ventricular izquierda ☐ d. Aumento de la frecuencia cardíaca ✔
Pregunta 9 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Con respecto al shock obstructivo extracardiaco, señale la correcta: ☒ a. Todas las citadas son falsas ☐ b. Una causa puede ser la embolia pulmonar ☐ c. Juega un papel fundamental en la patogenia de la enfermedad la obstrucción al flujo urinario en caso de infección. ☐ d. La redistribución de la obstrucción usualmente resuelve el shock. ✔
Pregunta 10 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Señale cuál de las siguientes no se considera una causa secundaria de dislipemia: ☐ a. Hipercolesterolemia poligénica ☐ b. Obesidad ☐ c. Fármacos diuréticos ☒ d. Desnutrición ✖
Pregunta 11 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	La escala de coma de Glasgow, es una valoración del nivel de conciencia consistente en la evaluación de varios criterios de observación clínica. Señale cuáles son dichos criterios: ☐ a. Apertura ocular, respuesta verbal, respuesta motora. ☒ b. Movilidad ocular, respuesta auditiva, movilidad de extremidades ☐ c. Movilidad general, respuesta facial, apertura nasal. ☐ d. Respuesta tendinosa, apertura bucal, respuesta sensitiva. ✖
Pregunta 12 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Respecto a la deshidratación hipertónica, indique cuál es la respuesta correcta: ☐ a. Suele deberse a una pérdida o déficit de agua y sodio ☐ b. La osmolaridad plasmática está disminuida como consecuencia de la hiponatremia, ☒ c. El exceso de hormona antidiurética es una de sus principales causas al facilitar la pérdida de agua libre de solutos. ☐ d. La sintomatología neurológica, desde la obnubilación al coma, entre otras, suelen ser las manifestaciones clínicas más relevantes de este trastorno. ✖
Pregunta 13 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Sobre el metabolismo de la bilirrubina señale lo más apropiado: Seleccione una: ☐ a. La enzima hemo-oxidasa actúa sobre la hemoglobina desdoblándola en globina y bilirrubina. ☐ b. La bilirrubina indirecta es producida por los macrófagos y es eliminada vía urinaria sin pasar por el hígado. ☒ c. La bilirrubina indirecta procede del metabolismo de la biliverdina. ☐ d. La bilirrubina directa es convertida en indirecta por acción de la enzima UDP-glucuronil transferasa. ✔
Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	La anamnesis es ☐ a. Las exploraciones complementarias que le hacemos al paciente (radiología, analítica, etc) ☐ b. El conjunto de los síntomas que vemos en el enfermo ☒ c. Lo que nos cuenta el enfermo. ☐ d. El proceso clínico del diagnóstico del paciente. ✔
Pregunta 15 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Señale la correcta con respecto al aumento de la PTHi: ☒ a. Aumenta la concentración de Calcio plasmático y urinario, con disminución del fósforo urinario, pero aumento del plasmático. ☐ b. Aumenta la concentración de Calcio y fósforo plasmático, con disminución del calcio y fósforo urinario. ☐ c. Aumenta la concentración de Calcio plasmático y urinario, con aumento del fósforo plasmático y del urinario. ☐ d. Aumenta la concentración de Calcio plasmático y urinario, con disminución del fósforo plasmático con aumento del urinario. ✖
Pregunta 16 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	¿Cuál de las siguientes NO es una manifestación del prolactinoma? Seleccione una: ☒ a. Diarrea con esteatorrea. ☐ b. Dolor de cabeza y alteraciones de la visión. ☐ c. Amenorrea. ☐ d. Galactorrea ✔
Pregunta 17 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Una de las siguientes circunstancias NO aumenta la tensión arterial ☐ a. Ejercicio físico ☐ b. Calor ☐ c. La digestión ☒ d. la carga emocional ✖
Pregunta 18 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Un paciente presenta un pH de 7,30 y una PCO2 de 78 mmHg, una de las parejas es correcta en cuanto al diagnóstico y su causa: ☐ a. Alcalosis respiratoria. Hiperventilación ☒ b. Acidosis respiratoria. Hipoventilación ☐ c. Acidosis respiratoria. Hiperventilación ☐ d. Alcalosis respiratoria. Hipoventilación ✔
Pregunta 19 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Una excreción fraccional menor de 1 es sugerente de: ☒ a. Insuficiencia renal aguda prerrenal. ☐ b. Insuficiencia renal aguda parenquimatosa con afectación intersticial tipo necrosis tubular aguda. ☐ c. Insuficiencia renal aguda postrenal ☐ d. Todas las citadas son falsas. ✔
Pregunta 20 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En relación al síndrome de Cushing señale la respuesta correcta: Seleccione una: ☐ a. Se caracteriza por una hiperproducción de catecolaminas a nivel de la corteza suprarrenal. ☐ b. Se caracteriza por un déficit de cortisol que puede ser endógeno o exógeno. ☒ c. Entre las manifestaciones clínicas más características destacan: Acúmulo de grasa abdominal y en espalda (joroba de búfalo), cara redondeada (de luna llena) y estrías rojo-vinosas en abdomen. ☐ d. El diagnóstico de laboratorio consiste en detectar: Cortisol basal bajo, hipoglucemias, déficit de colesterol, hipercaliemia. ☐ e. El tratamiento consiste en administrar corticoides por vía oral o endovenosa.
Pregunta 21 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	¿Cuál de las siguientes patologías no se asocia a la obesidad? Seleccione una: ☐ a. Artrosis. ☐ b. Reflujo gastroesofágico. ☒ c. Enfisema pulmonar. ☐ d. Apnea del sueño. ✔
Pregunta 22 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Cual es el mayor estímulo para la liberación de insulina por la célula beta pancreática: ☐ a. La somatostatina ☐ b. La sensibilidad a la insulina ☐ c. La estimulación alfa adrenérgica ☒ d. La glucosa ✔
Pregunta 23 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Señale cuál de las siguientes no se corresponde con un subtipo de hipersensibilidad tipo IV: Seleccione una: ☐ a. Tipo tuberculínica. ☐ b. Tipo granulomatoso. ☐ c. Tipo dermatitis de contacto. ☒ d. Enfermedad de Goodpasture. ✔
Pregunta 24 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	¿Cuál de los siguientes afirmaciones considera errónea en el tratamiento de la sepsis? Seleccione una: ☐ a. El tratamiento inicial debe incluir la administración de soluciones cristaloides para la resucitación inicial, la toma de cultivos y la administración de antibióticos de forma precoz ☐ b. El control del foco infeccioso debe ser una prioridad ☐ c. Cada hora de retraso sin tratamiento empeora el pronóstico de la sepsis. ☒ d. Es una enfermedad que requiere bastante tiempo y pruebas complementarias para su diagnóstico por lo que el tratamiento se puede y debe demorar hasta disponer del resultado de los hemocultivos ✔
Pregunta 25 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En la exploración física de un paciente con enfisema es frecuente encontrar: Seleccione una: ☒ a. Tórax en tonel con imagen radiológica de horizontalización de las costillas ☐ b. Aumento de peso. ☐ c. Taquipnea con inspiración prolongada ☐ d. Hábito pícnico ✔
Pregunta 26 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	El óxido nítrico, en la inflamación, interviene produciendo básicamente ☐ a. Vasodilatación y daño tisular. ☐ b. Induce secreción de leucotrienos ☐ c. Induce fiebre y agregación plaquetaria ☒ d. Dolor ✖
Pregunta 27 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	La presencia de creatinina elevada en sangre, con orina con baja densidad, pero con sodio urinario alto es sugestivo de ☐ a. Insuficiencia renal aguda postrenal obstructiva ☒ b. Insuficiencia renal aguda parenquimatosa con afectación intersticial tipo necrosis tubular aguda. ☐ c. Insuficiencia renal aguda postrenal obstructiva. ☐ d. Insuficiencia renal aguda prerrenal. ✔
Pregunta 28 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Una persona con una PO2 de 55 mmHg tendrá una hipoxia en sus células de tipo: Seleccione una: ☒ a. Hipoxémica ☐ b. Anémica ☐ c. Histotóxica ☐ d. Circulatoria local ✔
Pregunta 29 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	¿Qué dice la ley de Frank-Starling de la contractilidad cardíaca? Seleccione una: ☐ a. Que al disminuir la contractilidad aumenta el gasto cardíaco. ☐ b. Establece una relación directa entre las resistencias periféricas y la contractilidad. ☐ c. Que al aumentar la contractilidad aumenta el gasto cardíaco. ☒ d. Que al aumentar el estiramiento de las fibras cardíacas en la diástole aumenta el volumen sistólico. ✔
Pregunta 30 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Indique la respuesta falsa en relación al Derrame Pleural (DP): Seleccione una: ☐ a. El DP paraneumónico es el más frecuente de los exudados ☒ b. Los exudados se producen por disminución de la permeabilidad de la superficie pleural y son pobres en proteínas. ☐ c. El DP con características de empiema debe ser drenado. ☐ d. Los DP con características de trasudados son más frecuentes que los exudados ✔

Pregunta 1 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 Marcar pregunta	Señale la respuesta INCORRECTA con respecto a la gota: ☐ a. El aumento de la eliminación urinaria del producto natural acumulado, podría producir urolitiasis. ☐ b. La gota es la manifestación clínica del depósito de un producto natural en los tejidos, con elevación de reactantes de fase aguda. ☐ c. Hay acúmulo de un producto de degradación de las proteínas, como es la cistina. ☒ d. En su tratamiento el producto natural acumulado podría ser transformado en lanolina para ser eliminado.
--	--

Pregunta 1 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En la intoxicación por vitamina D suele haber: Seleccione una: ☐ a. Hipercalcemia y aumento de P plasmático ☐ b. Hipercalcemia y descenso de P plasmático ☐ c. Hipercalcemia y aumento de AMP cíclico urinario. ☐ d. Hipocalcemia y aumento de P plasmático.
Pregunta 2 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Si un paciente presenta en la analítica hipernatremia con aumento de la osmolaridad plasmática. ¿cuál de las siguientes será la causa más probable que la originó? Seleccione una: ☐ a. Déficit de ingesta de agua. ☐ b. Excesiva ingesta de agua ☒ c. Pérdida de sodio con aumento de la ingesta de agua ☐ d. Excesiva ingesta de sodio y agua.
Pregunta 3 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	La presencia de creatinina elevada en sangre, con orina concentrada con osmolaridad elevada, pero con sodio urinario bajo es típico de: Seleccione una: ☐ a. Shock séptico ☒ b. Insuficiencia renal aguda postrenal. ☐ c. Insuficiencia renal aguda parenquimatosa con afectación intersticial tipo necrosis tubular aguda. ☐ d. Insuficiencia renal aguda prerenal.
Pregunta 4 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Señale lo más apropiado respecto a la hipertermia por golpe de calor. Seleccione una: ☒ a. Es un desequilibrio entre la producción de calor y la capacidad de eliminarlo. ☐ b. Se caracteriza por una temperatura corporal > 41°C. ☐ c. Se controla con fármacos antitérmicos pero no con antibióticos. ☐ d. Aparece exclusivamente en personas de edad avanzada.
Pregunta 5 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Sobre la definición de ICTUS, señale lo incorrecto: Seleccione una: ☐ a. Su causa es vascular. ☐ b. Consiste en un déficit neurológico. ☒ c. Se debe a la degeneración progresiva e irreversible de las neuronas piramidales del área 4. ☐ d. La causa isquémica es más frecuente que la hemorrágica.
Pregunta 6 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En la hipersensibilidad tipo I la histamina es la principal sustancia mediadora. Entre sus funciones no destaca: Seleccione una: ☐ a. Contrae el músculo liso. ☐ b. Vasodilatador periférico: ocasiona hipotensión arterial. ☒ c. Disminuye la permeabilidad capilar ☐ d. Irrita las terminaciones nerviosas.
Pregunta 7 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Cual es el mayor estímulo para la liberación de insulina por la célula beta pancreática: ☐ a. La somatostatina ☐ b. La glucosa ☒ c. La estimulación alfa adrenérgica ☐ d. La sensibilidad a la insulina
Pregunta 8 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Un paciente en shock séptico con lactato elevado tendrá: Seleccione una: ☐ a. Acidosis respiratoria ☐ b. Acidosis metabólica ☐ c. Alcalosis respiratoria ☒ d. Alcalosis metabólica
Pregunta 9 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En que tipo de diabetes aparecen anticuerpos específicos: Seleccione una: ☒ a. Diabetes Mellitus tipo 2 ☐ b. Diabetes Gestacional ☐ c. Diabetes Mellitus tipo 1 B (idiopática) ☐ d. Diabetes Mellitus tipo 1 A (mediada por Linfocitos T)
Pregunta 10 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	La acromegalia se debe a: Seleccione una: ☒ a. Hiperproducción de GH en la edad adulta ☐ b. Hipersensibilidad de los cartílagos de crecimiento a pequeñas cantidades de prolactina. ☐ c. Aumento de la sensibilidad tisular a la ACTH con hiperproducción compensadora de GH. ☐ d. Disminución de la producción de GH.
Pregunta 11 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	El exoftalmos es típico de: Seleccione una: ☐ a. La enfermedad de Cushing ☐ b. La enfermedad de Addison ☒ c. El hipotiroidismo ☐ d. La enfermedad de Graves-Basedow
Pregunta 12 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Unos de los parámetros enunciados no se realiza con una gasometría arterial: ☐ a. PCO2 ☐ b. PO2 ☒ c. Cloro ☐ d. Bicarbonato ☐ e. Esta opción fue eliminada después de que el intento fuera iniciado.
Pregunta 13 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	¿Cuál de las siguientes NO es una manifestación de la cirrosis hepática? Seleccione una: ☐ a. Hemorragia por varices esofágicas. ☒ b. Angina estable ☐ c. Asterixis ("flapping tremor"). ☐ d. Feminización en varones
Pregunta 14 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En cuanto a la intolerancia a disacáridos, determine la respuesta verdadera. Seleccione una: ☐ a. La intolerancia a la lactosa se produce por un exceso de lactasa en el borde en cepillo del intestino delgado. ☒ b. La clínica consiste en diarrea, meteorismo, distensión abdominal y cólicos abdominales ☐ c. La intolerancia a la lactosa se diagnostica habitualmente mediante biopsia intestinal. ☐ d. El tratamiento consiste en incrementar en la dieta el carbohidrato responsable de la clínica. ☐ e. La administración de calcio y vitamina D, junto con probióticos estaría contraindicado.
Pregunta 15 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Entre las posibles causas de insuficiencia coronaria, indique cual de las siguientes situaciones no se caracteriza por disminución del aporte de oxígeno: Seleccione una: ☒ a. Ateromatosis en arterias coronarias ☐ b. Anemia ☐ c. Taquicardia con disminución del tiempo diastólico ☐ d. Saturación de oxígeno en sangre mayor de 95%.
Pregunta 16 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Un paciente cuenta episodios de dolor prolongado de unos 30 minutos, intenso y progresivo, que a veces le ocurre en reposo, y que le cede con cafinitrina. En la analítica no vemos marcadores de necrosis. La causa más probable es: Seleccione una: ☐ a. Infarto agudo de miocardio ☐ b. Isquemia silente ☒ c. Angor inestable ☐ d. Angor estable
Pregunta 17 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En el shock distributivo hay una alteración de: Seleccione una: ☐ a. En el volumen circulante. ☐ b. En los vasos adyacentes a la lesión. ☒ c. En la función de bomba cardíaca, por alteración de la distribución de la sangre cardíaca. ☐ d. En el tono de los vasos sanguíneos
Pregunta 18 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	¿,Cuál de las siguientes no se incluye en la clasificación etiopatogénica de las hiperlipemias dentro de las de origen hereditario: Seleccione una: ☐ a. Déficit familiar de lipoproteinlipasa ☐ b. Hiperlipemia familiar combinada. ☒ c. Hipercolesterolemia poligénica. ☐ d. Hipertrigliceridemia de la diabetes mellitus
Pregunta 19 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Indique la respuesta falsa: Seleccione una: ☐ a. El derrame pleural secundario a procesos pulmonares de etiología infecciosa tiene características de exudado ☒ b. En la fase intersticial de la neumonía es típico la auscultación del llamado soplo tubárico. ☐ c. El derrame pleural secundario a neoplasia suele ser sanguinolento y de predominio linfocitario. ☐ d. El neumotórax se define como la presencia de aire en la cavidad pleural
Pregunta 20 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Desde el punto de vista fisiopatológico en el asma bronquial no se produce: Seleccione una: ☒ a. Broncoespasmo ☐ b. Broncoconstricción ☐ c. Hiposecreción de moco ☐ d. Edema de pared bronquial
Pregunta 21 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En un paciente con hepatitis aguda vírica e ictericia ¿qué hallazgo sería más probable? Seleccione una: ☐ a. Hiperbilirrubinemia mixta sin coluria y sin urobilinógeno en orina. ☐ b. Hiperbilirrubinemia indirecta con coluria y sin urobilinógeno en orina. ☐ c. Hiperbilirrubinemia directa con coluria y sin urobilinógeno en orina. ☒ d. Hiperbilirrubinemia mixta con coluria y con urobilinógeno en orina.
Pregunta 22 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Señale cuál de los siguientes circunstancias NO aumenta el gasto cardíaco Seleccione una: ☐ a. Aumento de las resistencias periféricas ☒ b. Aumento de la contractilidad ☐ c. Incremento del tono venoso ☐ d. Incremento de la volemia
Pregunta 23 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Señale la correcta con respecto a la reacción sistémica de fase aguda Seleccione una: ☐ a. No suele haber un aumento de ACTH ni de las hormonas conrainsulares ☒ b. Se caracteriza por fiebre y disminución de apetito, entre otros. ☐ c. Nunca puede llegar a producirse shock ☐ d. Es infrecuente la neutrofilia
Pregunta 24 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Señale la respuesta correcta en relación con la deshidratación isotónica: Seleccione una: ☐ a. La hipernatremia es un hallazgo frecuente. ☒ b. En la patogenia se describe la pérdida de agua como principal mecanismo responsable por lo que la osmolaridad plasmática está elevada. ☐ c. La consecuencia principal es la reducción de la volemia que si es importante, puede dar lugar a shock hipovolémico. ☐ d. Siempre da síntomas graves por lo que no hay formas leves de presentación clínica
Pregunta 25 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En la desnutrición de ayuno (marasmo) no es cierto que exista: Seleccione una: ☐ a. Disminución de masa muscular. ☐ b. Deprivación de aporte calórico. ☐ c. Ausencia de grasa subcutánea. ☒ d. Función inmunitaria normofuncionante.
Pregunta 26 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Señala la afirmación <u>correcta</u> Seleccione una: ☒ a. La mayor parte de la microbiota se encuentra en el intestino grueso, aunque existe también en menor medida en el intestino delgado ☐ b. La disbiosis intestinal es el estado normal de la microbiota. ☐ c. El intestino delgado posee movimientos de propulsión y retropropulsión ☐ d. La digestión química se realiza fundamentalmente en el intestino grueso.
Pregunta 27 Incorrecta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	Como se denomina tener una Tensión arterial de 150/95 mmHg en consulta y en domicilio de 145/80 mmHg Seleccione una: ☒ a. Hipertensión clínica aislada ☐ b. Hipertension enmascarada ☐ c. Hipertensión arterial ☐ d. Normotensión
Pregunta 28 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En cuanto al síndrome de Addison, señale la respuesta correcta. Seleccione una: ☐ a. La crisis addisoniana no es una emergencia. Se trata de una entidad banal y muy frecuente. ☒ b. Clínicamente se manifiesta como hipopigmentación de piel y mucosas, hipertensión arterial, estreñimiento, hiperglucemia y aumento del apetito. ☐ c. La destrucción del 10% de la glándula suprarrenal sería suficiente, para desencadenar clínica. ☐ d. El tratamiento de la crisis addisoniana es hidrocortisona y sueroterapia endovenosos, así como el tratamiento de la infección o traumatismo desencadenante. ☐ e. En el síndrome de Addison, aumenta la producción de cortisol por la glándula suprarrenal, con un aumento de ACTH y CRH, a través de un feedback positivo.
Pregunta 29 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	El estímulo principal para la secreción de enzimas pancreáticas es: Seleccione una: ☐ a. Péptido intestinal vasoactivo (VIP). ☐ b. Colecistocinina ☒ c. Secretina ☐ d. Acetilcolina.
Pregunta 30 Incorrecta Se puntúa 0,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	En la semiología clínica de la pancreatitis aguda puede aparecer algunos de los siguientes síntomas y signos excepto: Seleccione una: ☐ a. El dolor abdominal suele ser de comienzo brusco, continuo y de intensidad leve ☐ b. Se acompaña con frecuencia de náuseas y vómitos y en ocasiones con hematemesis ☒ c. El dolor abdominal se localiza en región epigástrica con irradiación a ambos hipocondrios (en cinturón), a la espalda o zona periumbilical ☐ d. En las formas graves puede cursar con shock: hipotensión arterial, taquipnea, taquicardia,...

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes combinaciones considera más típica de una hepatitis B aguda.

☐

a. AghBs +, AchBc + y AchBs +

☐

b. Ninguna es correcta.

☒

c. AghBs -, AchBc+ y AchBs -.

☐

d. AghBs +, AchBc+ y AchBs -.

La respuesta correcta es:

AghBs +, AchBc+ y AchBs -.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes NO es un objetivo del tratamiento de la angina estable:

☐

a. Disminuir la agregación plaquetaria con aspirina.

☒

b. Disminuir el consumo de oxígeno del corazón con betabloqueantes.

☐

c. Disminuir los niveles de colesterol-HDL con estatinas.

☐

d. Disminuir el consumo de oxígeno del corazón con vasodilatadores venosos.

La respuesta correcta es:

Disminuir los niveles de colesterol-HDL con estatinas.

Pregunta 3

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

. Indica que respuesta es FALSA

☒

a. Trastornos de la pared torácica como pectum excavatum o cifoescoliosis pueden dar lugar a un patrón restrictivo pulmonar

☐

b. La capacidad vital es igual al volumen corriente mas el volumen residual

☐

c. Bronquitis crónica, enfisema pulmonar y asma bronquial presentan un trastorno ventilatorio obstructivo

☐

d. Volúmen corriente es el movlizado durante una respiración normal y equivale a unos 500mL.

La respuesta correcta es: La capacidad vital es igual al volumen corriente mas el volumen residual

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

La vía piramidal:

☐

a. Es la responsable del control del movimiento, actuando como un elemento coordinador y facilitador

☐

b. Ninguna es correcta.

☒

c. Se origina en las neuronas piramidales del área 4 y se decusa en el tronco cerebral para hacer sinapsis con la motoneurona del asta anterior

☐

d. Se origina en las neuronas piramidales del cerebelo y, tras decusarse en el hipotálamo, desciende hasta hacer sinapsis en el músculo mediante la placa motora

La respuesta correcta es:

Se origina en las neuronas piramidales del área 4 y se decusa en el tronco cerebral para hacer sinapsis con la motoneurona del asta anterior

Pregunta 5

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Respecto a las escalas de gravedad de la sepsis (SOFA y quick SOFA) señale la respuesta INCORRECTA:

☐

a. Una puntuación mayor o igual a 2 sobre el SOFA basal refleja un criterio de mortalidad importante.

☐

b. El quick SOFA tiene en cuenta 3 parámetros: escala de Glasgow, tensión arterial sistólica y frecuencia respiratoria

☒

c. El quick SOFA (qSOFA) tiene una validez predictiva similar al SOFA.

☐

d. La escala SOFA valora la disfunción de 4 órganos.

La respuesta correcta es: La escala SOFA valora la disfunción de 4 órganos.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

La enfermedad que se relaciona con gran acúmulo de Fe orgánico de origen hereditario se denomina

☒

a. Metacromasia

☐

b. Ocronosis

☐

c. Enfermedad de Wilson

☐

d. Hemocromatosis

La respuesta correcta es:

Hemocromatosis

Pregunta 7

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

La hipofunción hipofisaria se denomina:

☐

a. Hipoparatiroidismo

☒

b. Hipotiroidismo

☐

c. hipocortisolismo

☐

d. Hipopituitarismo

La respuesta correcta es:

Hipopituitarismo

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Señale cual de los siguientes NO es un agente etiológico endógeno:

Seleccione una:

☐

a. La edad

☐

b. El sexo

☐

c. La raza

☒

d. Las radiaciones solares

La respuesta correcta es:

Las radiaciones solares

Pregunta 9

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Respecto a la estenosis aórtica, seleccione lo más apropiado:

☐

a. Ocasiona una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo y la hipertrofia del mismo.

☐

b. Ocasiona una sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda y en el ventrículo derecho.

☐

c. Ocasiona una hipertrofia del ventrículo derecho y la consiguiente estenosis tricuspídea retrógrada.

☒

d. Ocasiona una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo y una dilatación de la aurícula izquierda.

La respuesta correcta es:

Ocasiona una sobrecarga de presión en el ventrículo izquierdo y la hipertrofia del mismo.

Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

En el manejo de control de la hiperglucemia se debe tener en cuenta todas menos una

Seleccione una:

☐

a. El tipo de diabetes

☐

b. Expectativa de vida

☒

c. Riesgo de hipoglucemias

☐

d. Duración de la diabetes

La respuesta correcta es: El tipo de diabetes

Pregunta 11

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Dentro de las manifestaciones extraintestinales más frecuentes descritas en la Enfermedad de Crohn se incluye las siguientes, excepto una:

☒

a. Espodiloartritis.

☐

b. Pancreatitis Aguda.

☐

c. Trombosis venosa.

☐

d. Eritema nodoso.

La respuesta correcta es: Pancreatitis Aguda.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Respecto a los efectos del sedentarismo sobre el estado de salud:

☐

a. Disminuye el riesgo de padecer infecciones intestinales por enterobacterias.

☐

b. Todas las anteriores son correctas.

☐

c. Disminuye el riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2

☒

d. Aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama

La respuesta correcta es:

Aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Señale la respuesta verdadera con respecto al cáncer de colon

☐

a. En mas de un 10% de los casos de sangre en heces positiva, se detecta un cáncer en tubo digestivo

☐

b. La inestabilidad de microsátélites no se relaciona con la presentación del cáncer de colon.

☐

c. El gen BRCA1 se presenta, pero no el BRCA2

☒

d. Se relaciona con la colitis ulcerosa

La respuesta correcta es:

Se relaciona con la colitis ulcerosa

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Señale la correcta en relación a la osteoporosis:

☐

a. La osteoporosis senil se considera una osteoporosis primaria

☐

b. En la osteoporosis postmenopáusica hay un aumento de actividad de los osteoblastos.

☐

c. Es una alteración cualitativa de la remodelación ósea.

☒

d. El factor básico que la produce en las mujeres postmenopáusicas es el aumento de estrógenos

La respuesta correcta es:

La osteoporosis senil se considera una osteoporosis primaria

Pregunta 15

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

La causa más frecuente de bocio a nivel mundial es:

☐

a. El déficit de yodo en la dieta.

☒

b. Las tiroiditis infecciosas.

☐

c. El déficit de producción de hormonas tiroideas T4 y T3.

☐

d. La dieta con exceso de consumo de sodio y falta de potasio

La respuesta correcta es:

El déficit de yodo en la dieta.

Pregunta 16

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

En cuanto al Helicobacter pylori es FALSO:

☐

a. Se considera un factor de riesgo que predispone a la aparición de Cáncer gástrico.

☐

b. Afecta fundamentalmente al estómago

☒

c. Su tratamiento fundamental es con antibióticos

☐

d. Su tratamiento es fundamentalmente quirúrgico .

La respuesta correcta es:

Su tratamiento es fundamentalmente quirúrgico .

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Qué es lo más importante en el código ictus:

☐

a. El tipo y calidad de los medios de transporte.

☐

b. El número de pruebas necesarias para el diagnóstico.

☐

c. La clínica que presenta el paciente.

☒

d. El tiempo entre la aparición de síntomas y la administración del tratamiento

La respuesta correcta es:

El tiempo entre la aparición de síntomas y la administración del tratamiento

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

La práctica clínica actualmente se caracteriza por:

☐

a. La profesionalización de la gestión sanitaria.

☒

b. Los profesionales hacen uso generalizado de la herramienta más coste-efectiva que es la historia clínica frente a la innovación tecnológica.

☐

c. La variabilidad de la práctica médica.

☐

d. La continuidad del proceso asistencial entre niveles asistenciales.

La respuesta correcta es: La variabilidad de la práctica médica.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

Los nutrientes son:

☐

a. Sustancias sin contenido calórico que no desempeñan funciones biológicas.

☒

b. Constituyentes básicos de los alimentos, son las sustancias capaces de ser utilizadas por el organismo para desempeñar funciones biológicas.

☐

c. Aquellos productos (sólidos o líquidos) que poseen características sensoriales capaces de excitar el apetito.

☐

d. Conjunto de agua y alimentos que una persona ingiere al cabo del día.

La respuesta correcta es: Constituyentes básicos de los alimentos, son las sustancias capaces de ser utilizadas por el organismo para desempeñar funciones biológicas.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩

 Marcar pregunta

En el periodo de uremia de la insuficiencia renal crónica avanzada que no aparece:

Seleccione una:

☐

a. Anemia

☒

b. Poliuria

☐

c. Edemas

☐

d. Hipertensión arterial

La respuesta correcta es: Poliuria